

**ROCGEL 1,2 g**  
Suspension buvable  
Sachets-dose

**1. QU'EST-CE QUE ROCGEL 1,2 G, SUSPENSION BUVALE EN SACHET-DOSE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**a) CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE**

ANTI-ACIDE

(A : appareil digestif et métabolisme)

**b) INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**

Ce médicament est indiqué dans les douleurs, brûlures et aigreurs de l'estomac ou de l'œsophage.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ROCGEL 1,2 G, SUSPENSION BUVALE EN SACHET-DOSE ?**

**a) CONTRE-INDICATIONS**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'insuffisance rénale sévère (détailance des fonctions du rein).  
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**b) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Par précaution, il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Si vous suivez un régime limité en hydrate de carbone, régime sans sucre ou régime diabétique, tenir compte de l'apport en saccharose (1,90 g par sachet-dose).

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**c) INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS**

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, et notamment avec les quinidiques, il FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

**d) GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

**e) LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE**

Teneur en saccharose : 1,90 g par sachet-dose - Parahydroxybenzoate de méthyle sodé - Parahydroxybenzoate de propyle sodé - Sorbate de potassium

**3. COMMENT PRENDRE ROCGEL 1,2 G, SUSPENSION BUVALE EN SACHET-DOSE ?**

**a) POSOLOGIE**

Un sachet au moment des douleurs, sans dépasser 6 sachets par jour.

**b) MODE D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

Le contenu du sachet doit être avalé directement dans la bouche.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

En cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses, une diminution du taux de phosphore dans le sang peut survenir. **SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

**5. COMMENT CONSERVER ROCGEL 1,2 G, SUSPENSION BUVALE EN SACHET-DOSE ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

**6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

**a) LISTE COMPLÈTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXCIPIENTS**

Oxyde d'aluminium hydraté (boehmite) ..... 8,0800 g  
Quantité correspondant à oxyde d'aluminium ..... 1,2120 g

Pour un sachet-dose.

Polyvidone, saccharose, hydroxyéthylcellulose, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, parahydroxybenzoate de propyle sodé, composition aromatique, eau purifiée.

**b) FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Suspension buvable, sachets-dose.

**c) TITULAIRE**

DEBREGEAS ET ASSOCIÉS PHARMA - D&A PHARMA - 79 RUE DE MIROMESNIL - 75008 PARIS

**d) EXPLOITANT**

DEBREGEAS ET ASSOCIÉS PHARMA - D&A PHARMA - 79 RUE DE MIROMESNIL - 75008 PARIS

**e) FABRICANT**

FARMACLAIR - 440 avenue du Général de Gaulle - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR - France

**f) DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE**

February 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Assaps (France).



**CECI EST UN MÉDICAMENT**

Ce médicament a pour but d'améliorer votre état digestif et, en particulier, de soulager vos maux d'estomac.

Si votre médecin ou votre pharmacien vous ont donné des instructions particulières adaptées à votre cas personnel, respectez leurs consignes. Généralement, ce médicament se prend environ 1 heure après chaque repas et/ou au moment des crises douloureuses.

Son utilisation ne doit pas vous dispenser d'une alimentation saine et régulière : en particulier, prenez le temps de manger tranquillement et, surtout, évitez de fumer ou de prendre des boissons alcoolisées longtemps après les repas ou quand vous êtes à jeun.

Si malgré ces recommandations vos troubles persistent, n'hésitez pas à consulter votre médecin, car ce médicament ne doit pas être pris sur une période trop prolongée sans avis médical.

Au cas où vous auriez à prendre, durant la même période, un autre traitement par voie orale, il peut être préférable de respecter un intervalle entre la prise des deux médicaments.

Signalez systématiquement à votre médecin, comme à votre pharmacien, les médicaments que vous prenez déjà, avant qu'il ne rédige une ordonnance ou ne délivre un médicament.

**VOTRE MÉDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MÉDICAMENTS,  
N'HÉSITEZ PAS À LEUR DEMANDER DES PRÉCISIONS.  
NE LAISSEZ JAMAIS UN MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.**